PARTIE III : RENSEIGNEMENTS AU CONSOMMATEUR

Dulcolax®
(Bisacodyl) **Suppositoires**

Ce dépliant fait partie du Guide thérapeutique publié pour DULCOLAX et s'adresse spécifiquement aux consommateurs. Ce dépliant sert de résumé et, par conséquent, ne contient pas tous les renseignements disponibles au sujet de DULCOLAX. Veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des questions concernant ce médicament.

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

À quoi sert ce médicament :
DULCOLAX est utilisé pour le soulagement de la constipation occasionnelle.

Sous supervision médicale, DULCOLAX est également utilisé pour vider les intestins avant et après une chirurgie et avant certains tests.

Comment agit ce médicament :
DULCOLAX appartient à un groupe de médicaments nommés laxatifs stimulants. DULCOLAX stimule les muscles intestinaux tout en favorisant l'accumulation d'eau dans les intestins. Cet effet permet de ramollir les selles et d'en faciliter le passage.

Quand ne devrait-on pas utiliser ce médicament :
- Si vous avez une douleur abdominale grave accompagnée de nausées et de vomissements.
- Si vous avez une occlusion intestinale (iléus), une maladie intestinale inflammatoire aiguë ou une appendicite.
- Si vous souffrez de déshydratation grave.
- Si vous avez une allergie au médicament ou à tout ingrédient contenu dans le produit (voir les ingrédients non médicinaux).

Ingrédient actif :
Bisacodyl

Principaux ingrédients non médicinaux :
Les suppositoires contiennent : graisse solide.

Présentation:
Dragées à 5 mg
Suppositoires à 10 mg

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

AVANT de prendre DULCOLAX, veuillez aviser votre médecin ou votre pharmacien :
- Si vous avez eu une réaction allergique à ce médicament ou à tout autre médicament.
- Si vous avez une douleur abdominale, des crampes à l'estomac, de la fièvre, des nausées ou des vomissements.
- Si vous êtes enceinte.
- Si vous avez pris DULCOLAX pendant une semaine sans constater d'effet.
- Si vous prenez tout autre médicament, y compris ceux vendus sans ordonnance, des herbes médicinales et des produits de médecine douce.

Ne pas donner DULCOLAX à un enfant, sauf sur la recommandation d'un médecin.

Vous ne devriez pas prendre de laxatif dans les deux (2) heures suivant la prise d'un autre médicament puisque l'effet prévu de l'autre médicament pourrait être amoindri.

Vous pourriez avoir des étourdissements ou vous évanouir (syncope) en raison du malaise provoqué par les spasmes abdominaux. En cas de spasmes abdominaux, veuillez éviter d'accomplir des tâches dangereuses telles que conduire une voiture ou opérer de la machinerie.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Les médicaments pouvant causer des interactions avec DULCOLAX comprennent : diurétiques (p. ex., hydrochlorothiazide), adrénocorticostéroïdes (p. ex., hydrocortisone, prednisone) et glucosides cardiaques (p. ex., digoxine).

Cette liste d'exemples n'est pas complète. Veuillez informer votre médecin et votre pharmacien de tous les médicaments obtenus sur ordonnance ou non, vitamines et produits à base de plantes médicinales que vous prenez.

UTILISATION ADÉQUATE DU MÉDICAMENT

Ne pas prendre une dose supérieure à la dose quotidienne recommandée. L'utilisation excessive ou prolongée de tout laxatif peut entraîner une dépendance au niveau de la fonction intestinale. Par conséquent, ne pas prendre pendant plus d'une semaine sans consulter un médecin.

Dose habituelle :
Pour le soulagement de la constipation :
Adultes et enfants de plus de 12 ans: Un suppositoire pour adultes (10 mg) par jour.

Les suppositoires agissent habituellement en 15 minutes à 1 heure.

Insérer un suppositoire DULCOLAX à 10 mg comme suit :

MODE D'EMPLOI : Retirer le suppositoire de son emballage en aluminium. Plonger le bout du suppositoire dans de l'eau tiède pendant quelques secondes pour en ramollir l'extérieur. Se coucher sur le côté et amener le genou opposé vers la poitrine. Relaxer le fessier avant d'introduire le suppositoire afin de

faciliter l'insertion. Insérer doucement le suppositoire lubrifié dans le rectum par l'extrémité en forme de pointe en premier. Pousser l'extrémité plate du suppositoire sur le côté pour s'assurer qu'une partie du suppositoire est en contact avec la paroi du rectum. Rester étendu pendant quelques minutes et contracter les muscles du fessier pour permettre la dissolution du suppositoire dans le rectum. Essayer de garder le suppositoire dans le rectum le plus longtemps possible.

Surdosage :
Si des doses élevées sont administrées, des selles liquides (diarrhée), des crampes abdominales et une perte de liquide, de potassium et d'autres minéraux peuvent survenir.

Un surdosage chronique au DULCOLAX peut causer une diarrhée chronique, une douleur abdominale, des lésions rénales et une faiblesse musculaire.

En cas de surdosage, vous devriez communiquer immédiatement avec votre médecin, votre pharmacien ou avec le centre antipoisons de votre région.

EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE

DULCOLAX peut causer des effets secondaires. Avisez votre médecin si les symptômes suivants sont graves ou persistent : malaises abdominaux (y compris des crampes abdominales, une douleur abdominale, des nausées, des vomissements ou de la diarrhée), déshydratation (accompagnée de symptômes tels que bouche sèche et pâteuse, soif), étourdissements, évanouissement (syncope), enflure du côlon (gros intestin), sensation ano-rectale désagréable (sensation désagréable au niveau de l'anus et du rectum) et émission de selles sanglantes.

Si vous présentez l'un ou l'autre des symptômes suivants, cessez de prendre DULCOLAX et communiquez immédiatement avec votre médecin : réactions allergiques (y compris l'enflure du visage, des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge pouvant entraîner une difficulté à avaler ou à respirer).

Cette liste d'effets secondaires n'est pas complète. Si vous éprouvez des effets indésirables pendant votre traitement par DULCOLAX, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.

ENTREPOSAGE

Garder hors de la portée des enfants. Garder dans un endroit frais et sec à la température de la pièce (15 à 25 °C).

RAPPORT D'EFFETS SECONDAIRES SOUPÇONNÉS

Afin de surveiller l'innocuité des médicaments, Santé Canada recueille des renseignements sur les effets inattendus et graves des médicaments par l'entremise du Programme Canada Vigilance. Si vous croyez que vous avez eu une réaction inattendue ou grave à ce médicament, vous pouvez en faire mention à Canada Vigilance :

Par téléphone (numéro sans frais) : 866-234-2345
Par télécopieur (numéro sans frais) : 866-678-6789
En ligne : www.santecanada.gc.ca/medeffet
Par courriel : CanadaVigilance@hc-sc.gc.ca

Par courrier :
Centre national Canada Vigilance
Division de l'information sur l'innocuité et l'efficacité des produits de santé commercialisés
Direction des produits de santé commercialisés
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Pré Tunney, IA : 0701C
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

REMARQUE : Si vous avez besoin d'information au sujet de la prise en charge d'un effet secondaire, communiquez avec votre professionnel de la santé avant de communiquer avec Canada Vigilance. Le Programme Canada Vigilance ne vise pas à fournir des conseils d'ordre médical.

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Ce document et le guide thérapeutique complet de DULCOLAX préparés à l'intention des professionnels de la santé peuvent être obtenus à l'adresse suivante : http://www.boehringer-ingelheim.ca ou en communiquant avec la compagnie Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée au 1-800-263-5103, poste 84633 (Information médicale).

Veuillez consulter notre site Web pour toute information récente.

Ce dépliant a été préparé par Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée.

Dernière révision : 13 janvier 2014

PARTIE III : RENSEIGNEMENTS AU CONSOMMATEUR

Dulcolax®
(Bisacodyl) **Dragées**

Ce dépliant fait partie du Guide thérapeutique publié pour DULCOLAX et s'adresse spécifiquement aux consommateurs. Ce dépliant sert de résumé et, par conséquent, ne contient pas tous les renseignements disponibles au sujet de DULCOLAX. Veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des questions concernant ce médicament.

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

À quoi sert ce médicament :
DULCOLAX est utilisé pour le soulagement de la constipation occasionnelle.

Sous supervision médicale, DULCOLAX est également utilisé pour vider les intestins avant et après une chirurgie et avant certains tests.

Comment agit ce médicament :
DULCOLAX appartient à un groupe de médicaments nommés laxatifs stimulants. DULCOLAX stimule les muscles intestinaux tout en favorisant l'accumulation d'eau dans les intestins. Cet effet permet de ramollir les selles et d'en faciliter le passage.

Quand ne devrait-on pas utiliser ce médicament :

- Si vous avez une douleur abdominale grave accompagnée de nausées et de vomissements.
- Si vous avez une occlusion intestinale (iléus), une maladie intestinale inflammatoire aiguë ou une appendicite.
- Si vous souffrez de déshydratation grave.
- Si vous avez une allergie au médicament ou à tout ingrédient contenu dans le produit (voir les ingrédients non médicinaux).
- Si vous avez une maladie héréditaire rare d'intolérance au galactose ou au fructose, vous ne devriez pas prendre les dragées DULCOLAX.
- Si vous avez une allergie au colorant tartrazine, vous ne devriez pas prendre les dragées DULCOLAX.

Ingrédient actif :
Bisacodyl

Principaux ingrédients non médicinaux :
Les dragées entéro-solubles contiennent : acacia, cire d'abeille, cire de carnauba, amidon de maïs, phtalate de dibutyle, eudragit, glycérine, lactose, stéarate de magnésium, polyéthylèneglycol, sucrose, talc, tartrazine (jaune) et dioxyde de titane.

Présentations :
Dragées à 5 mg
Suppositoires à 10 mg

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

AVANT de prendre DULCOLAX, veuillez aviser votre médecin ou votre pharmacien :

- Si vous avez eu une réaction allergique à ce médicament ou à tout autre médicament.
- Si vous avez une douleur abdominale, des crampes à l'estomac, de la fièvre, des nausées ou des vomissements.
- Si vous êtes enceinte.
- Si vous avez pris DULCOLAX pendant une semaine sans constater d'effet.
- Si vous prenez tout autre médicament, y compris ceux vendus sans ordonnance, des herbes médicinales et des produits de médecine douce.

Ne pas donner DULCOLAX à un enfant, sauf sur la recommandation d'un médecin.

Vous ne devriez pas prendre de laxatif dans les deux (2) heures suivant la prise d'un autre médicament puisque l'effet prévu de l'autre médicament pourrait être amoindri.

Vous pourriez avoir des étourdissements ou vous évanouir (syncope) en raison du malaise provoqué par les spasmes abdominaux. En cas de spasmes abdominaux, veuillez éviter d'accomplir des tâches dangereuses telles que conduire une voiture ou opérer de la machinerie.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Les médicaments pouvant causer des interactions avec DULCOLAX comprennent : diurétiques (p. ex., hydrochlorothiazide), adrénocorticostéroïdes (p. ex., hydrocortisone, prednisone), glucosides cardiaques (p. ex., digoxine), antiacides ou certains inhibiteurs de la pompe à protons (p. ex., lansoprazole, oméprazole, pantoprazole).

Ne pas prendre des médicaments pour l'indigestion au même moment de la journée que les dragées DULCOLAX. Ne pas prendre avec du lait ni avec des antiacides.

Cette liste d'exemples n'est pas complète. Veuillez informer votre médecin et votre pharmacien de tous les médicaments obtenus sur ordonnance ou non, vitamines et produits à base de plantes médicinales que vous prenez.

UTILISATION ADÉQUATE DU MÉDICAMENT

Ne pas prendre une dose supérieure à la dose quotidienne recommandée. L'utilisation excessive ou prolongée de tout laxatif peut entraîner une dépendance au niveau de la fonction intestinale. Par conséquent, ne pas prendre pendant plus d'une semaine sans consulter un médecin.

Ne pas écraser ni mâcher les dragées; celles-ci doivent être

avalées entières. Ne pas prendre avec du lait ni avec des antiacides.

Dose habituelle : Pour le soulagement de la constipation :
Adultes et enfants de plus de 12 ans : Une à deux dragées par jour.
Enfants de 6 à 12 ans : Une dragée par jour.

Prendre les dragées DULCOLAX au coucher pour produire une selle le lendemain matin.

On recommande de débuter le traitement à la dose la plus faible (1 dragée). La dose peut être ajustée jusqu'à une dose unique maximale de 2 dragées pour produire des selles régulières. Ne pas dépasser la dose quotidienne maximale.

Les dragées devraient être avalées en entier avec une quantité suffisante de liquide (SAUF DU LAIT).

Surdosage :
Si des doses élevées sont administrées, des selles liquides (diarrhée), des crampes abdominales et une perte de potassium et d'autres minéraux peuvent survenir.

Un surdosage chronique au DULCOLAX peut causer une diarrhée chronique, une douleur abdominale, des lésions rénales et une faiblesse musculaire.

En cas de surdosage, consultez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le centre anti-poisons de votre région.

EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE

DULCOLAX peut causer des effets secondaires. Avisez votre médecin si les symptômes suivants sont graves ou persistent : malaises abdominaux (y compris des crampes abdominales, une douleur abdominale, des nausées, des vomissements ou de la diarrhée), déshydratation (accompagnée de symptômes tels que bouche sèche et pâteuse, soif), étourdissements, évanouissement (syncope), enflure du côlon (gros intestin), sensation ano-rectale désagréable (sensation désagréable au niveau de l'anus et du rectum) et émission de selles sanglantes.

Si vous présentez l'un ou l'autre des symptômes suivants, cessez de prendre DULCOLAX et communiquez immédiatement avec votre médecin : réactions allergiques (y compris l'enflure du visage, des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge pouvant entraîner une difficulté à avaler ou à respirer).

Cette liste d'effets secondaires n'est pas complète. Si vous éprouvez des effets indésirables pendant votre traitement par DULCOLAX, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.

ENTREPOSAGE

Garder hors de la portée des enfants. Garder dans un endroit frais et sec à la température de la pièce (15 à 30 °C).

RAPPORT D'EFFETS SECONDAIRES SOUPÇONNÉS

Afin de surveiller l'innocuité des médicaments, Santé Canada recueille des renseignements sur les effets inattendus et graves des médicaments par l'entremise du Programme Canada Vigilance. Si vous croyez que vous avez eu une réaction inattendue ou grave à ce médicament, vous pouvez en faire mention à Canada Vigilance :

Par téléphone (numéro sans frais) : 866-234-2345
Par télécopieur (numéro sans frais) : 866-678-6789
En ligne : www.santecanada.gc.ca/medeffet
Par courriel : CanadaVigilance@hc-sc.gc.ca

Par courrier :
Centre national Canada Vigilance
Division de l'information sur l'innocuité et l'efficacité des produits de santé commercialisés
Direction des produits de santé commercialisés
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Pré Tunney, IA : 0701C
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

REMARQUE : Si vous avez besoin d'information au sujet de la prise en charge d'un effet secondaire, communiquez avec votre professionnel de la santé avant de communiquer avec Canada Vigilance. Le Programme Canada Vigilance ne vise pas à fournir des conseils d'ordre médical.

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Ce document et le guide thérapeutique complet de DULCOLAX préparés à l'intention des professionnels de la santé peuvent être obtenus à l'adresse suivante : http://www.boehringer-ingelheim.ca ou en communiquant avec la compagnie Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée au 1-800-263-5103, poste 84633 (Information médicale).

Veuillez consulter notre site Web pour toute information récente.

Ce dépliant a été préparé par Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée.

Dernière révision : 13 janvier 2014